

Att göra abort kan väcka många funderingar. På Kvinnokliniken har vi kuratorer som man kan kontakta för stöd och samtal i abortsituationen.

Det går bra att ringa:

Kurator Monica Lindblad 616 29 98

Kurator Kicki Ström 616 29 77

Kurator Kristina Westberg 616 29 97

Meri Liljegren

Överläkare

Agneta Zellbi

Överläkare

Gynekologmottagningen Södersjukhuset

## Välkommen till Södersjukhusets

### Gynekologmottagning

Viktig information att läsa i samband med läkarbesöket



## **Information till dig som skall göra abort och är gravid i vecka 14 till 18.**

Du har nu träffat doktorn som undersökt dig, gjort ultraljud och eventuellt tagit prov för klamydia. Du skall få träffa en barnmorska som kommer att ta blodprover på dig samt ge dig en tid då du skall komma till sjukhuset för själva aborten.

För att underlätta aborten används en kombination av medicinsk och kirurgisk abort.

När du skall göra aborten kommer du att bli inskriven på avdelning 72 eller 62. Du får en tablett som får graviditeten att stanna av. **När du tagit denna tablett kan du inte ändra ditt abortbeslut, eftersom den kan ha en fosterskadande effekt** En del kvinnor mår illa av tabletten och du får därför stanna kvar en timme på sjukhuset. Du får sedan gå hem. Du kan börja blöda och få mensliknande värk av tabletten.

Två dagar senare får du komma för inläggning på avdelningen. Du är välkommen att ha med en person som sällskap på avdelningen under dagtid. Där kommer du få föra upp slidtabletter var sjätte timme som verkar livmodersammandragande. Tabletterna kommer att göra så att graviditeten stöts ut. Om du får ont kommer du få hjälp med smärtstillande tabletter. Oftast utföres därefter en skrapning under narkos.

Du får räkna med att stanna ett par dagar på sjukhuset tills aborten är genomförd.

Vid utskrivningen från sjukhuset kommer du få en tid för återbesök på gynekologmottagningen. Detta återbesök är viktigt och sker inom ett par veckor efter hemkomsten.

Vi rekommenderar kuratorskontakt innan aborten.

*Om du planerar att börja med p-piller eller ta p-spruta är det lämpligt att börja med detta på operationsdagen eller senast dagen efter. Ofta kan man även få p-stav insatt samma dag som skrapningen. Spiral kan sättas in vid skrapningen*