

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialistmottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på www.fass.se.

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED ACE-HÄMMARE/ ANGIOTENSIN II-HÄMMARE



ACE-hämmare

Enalapril / Renitec
Ramipril / Triatec
Lisiniopril / Zestril
Accupro
Inhibace
Captopril

Angiotensin II-hämmare

Cozaar
Diovan
Aprovel
Atacand

SÖS
SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE

SÖS
SÖDERSJUKHUSET
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

Vad är ACE-hämmare och Angiotensin II-hämmare (All-hämmare)?

ACE-hämmare och All-hämmare fungerar båda genom att blockera ett hormonsystem i kroppen som är kraftigt aktiverat vid hjärtsvikt. Detta hormonsystem har skadliga effekter på hjärtat och sammandragande effekt på kärlen, vilket belastar det sviktande hjärtat.

ACE-hämmare och All-hämmare har en allmänt skyddande effekt hos patienter med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom. Båda läkemedlen förbättrar hjärtats pumpfunktion, minskar hjärtsviktsymptom, förbättrar kondition och prognos. Även vid nedsatt pumpfunktion utan symptom ses positiva långtidseffekter. Båda läkemedlen används även vid behandling av högt blodtryck. Att blodtrycket sjunker beror främst på läkemedlens kärilvidgande effekt.

Hur ska du ta läkemedlet?

Du bör svälja tabletten hel, gärna tillsammans med vätska. Om tabletten har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletten eftersom det kan förstöra delar av effekten. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har anpassat dosen för dig individuellt. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera med din läkare. Vanligen tar du medicinen på morgonen, eller på morgonen och kvällen.

I början kan du bli ordinerad en låg dos och därefter stegvis ökad dos. Det görs för att undvika biverkningar som lågt blodtryck. Om du gradvis ökar dosen kan biverkningar ofta undvikas. Får du ändå symptom går de ofta över. Under behandling tas blodprov för att kontrollera njurfunktionen och saltbalansen. Tar du läkemedlet mot högt blodtryck är en långsam ökning av dosen inte nödvändig. Behandlas du för hjärtsvikt ska du undvika att kombinera medicinen med vissa vanliga antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID, eftersom det kan göra hjärtsvikten sämre. Rådgör med din läkare.

Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmer att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Får du nya symptom när du börjar ta medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta i sådana fall din behandlande läkare för diskussion. En biverkan av ACE-hämmare kan vara torrhosta. En ovanlig men allvarlig biverkan är svullnad i ansiktet och i munnen. Uppstår det ska du sluta med läkemedlet och kontakta behandlande läkare.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller www.fass.se.