

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialistmottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på www.fass.se.

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED ALDOSTERON-ANTAGONISTER



Spironolaktone
Aldactone
Inspra

SÖS
SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE

SÖS
SÖDERSJUKHUSET
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

Vad är aldosteron-antagonister?

Aldosteron-antagonister är läkemedel som hämmar verkningarna av hormonet aldosteron. Nivåerna av aldosteron är förhöjda vid hjärtsvikt och har då skadliga effekter på hjärtat och kärlen. Aldosteron har även en negativ effekt på njurarna som gör att de behåller mer vätska i kroppen. Det belastar det sviktande hjärtat ytterligare. Läkemedlet motverkar dessa skadliga effekter av hormonet. Aldosteron-antagonister har en mild (urindrivande) verkan och har positiva effekter på hjärta och kärl samt förbättrar prognosen vid hjärtsvikt.

Hur ska du ta läkemedlet?

Du bör svälja tabletten hel, gärna tillsammans med vätska. Om tabletten har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra delar av effekten. Det spelar ingen roll om man tar tabletten med mat eller inte. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har anpassat dosen individuellt för dig. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera med din läkare.

Biverkningar

Medicinen har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Får du nya symptom när du börjar med medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta i sådana fall din behandlande läkare för diskussion. Aldosteron-antagonister har en kaliumsparande effekt och kan ibland ge för hög halt av kalium. Det kontrolleras med ett blodprov. Läkemedlet kan även ge hormonella biverkningar som ömhet i bröstet eller menstruationsrubbingar.

Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmet att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

Vill du veta mera?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller www.fass.se.