

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialismottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på www.fass.se.


SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED BETABLOCKERARE



Seloken Zoc/Metoprolol
Tenormin/Atenolol
Emconcor/Bisoprolol
Kredex/Karvedilol


SÖDERSJUKHUSET
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

Vad är betablockerare?

Betablockerare (eller betareceptorblockerare) är en grupp av läkemedel som används för behandling av högt blodtryck och hjärtklappningsbesvär. Läkemedlet förebygger även kärlkramp och hjärtinfarkt och är en del av behandlingen vid hjärtsvikt.

Så använder du läkemedlet?

Du bör svälja tablett hel, gärna tillsammans med vätska. Om tablett har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra delar av effekten. Det spelar ingen roll om man tar tablett med mat eller inte. Försök att ta tablett vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har anpassat dosen för dig individuellt. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera med din läkare.

Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmer att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Får du nya symptom när du börjar ta medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta i sådana fall din behandlande läkare för diskussion. Biverkningarna kan till exempel vara huvudvärk, yrsel, illamående, kalla händer och fötter eller potensproblem. Många biverkningar uppträder framförallt i början av behandlingen och försvinner oftast av sig själva.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller www.fass.se.