

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialismottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

### Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på [www.fass.se](http://www.fass.se).

## TILL DIG SOM BEHANDLAS MED BLODFÖRTUNNANDE LÄKEMEDEL



Trombyl  
Plavix

**SÖS**  
SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00  
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA  
[WWW.SODERSJUKHUSET.SE](http://WWW.SODERSJUKHUSET.SE)

**SÖS**  
SÖDERSJUKHUSET  
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

### **Vad är Plavix/Trombyl?**

Plavix/Trombyl är blodförtunnande läkemedel som på olika sätt påverkar blodplättarna (trombocytterna) så att blodet blir mer lättflytande och minskar benägenheten att bilda blodproppar. På det sättet minskar risken för till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

### **Så här använder du ta Plavix/Trombyl**

Du bör svälja tablett hel, gärna tillsammans med vätska. Om tablett har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra delar av effekten. Det spelar ingen roll om man tar tablett med mat eller inte. Försök att ta den vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har anpassat dosen till dig individuellt. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera det med din läkare.

### **Om du har glömt att ta läkemedlet**

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmer att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

### **Biverkningar**

Läkemedlet har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Om du får nya symptom när du börjar med medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta i sådana fall din behandlande läkare för en diskussion.

### **Blödningar:**

Den vanligast förekommande biverkningen är blödningar. Oftast är de mindre och ofarliga och kräver ingen åtgärd. Du kan till exempel få blåmärken lättare. Om blödningar blir ett problem ska du naturligtvis kontakta din läkare.

### **Magkatarr/magsår:**

En del får obehag i övre delen av buken och halsbränna av medicinen. Om det blir mycket besvärligt bör du låta undersöka din mage eller sätta in magskyddande behandling.

**Allergi:** Det är inte vanligt, men man kan vara allergisk mot läkemedlet. Om du får hudutslag, generell klåda, svullnads-känsla i halsen eller liknande ska du kontakta din läkare.

Du bör undvika att samtidigt använda antiinflammatorisk medicin eftersom det ökar risken för blödningar och magkatarr/magsår.

### **Vill du veta mer?**

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av Din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller [www.fass.se](http://www.fass.se).