

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialistmottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

### Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på [www.fass.se](http://www.fass.se).

## TILL DIG SOM BEHANDLAS FÖR STÖRNINGAR I HJÄRTRYTMEN



Durbis  
Tambacor  
Sotalol/Sotacor

  
SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00  
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA  
[WWW.SODERSJUKHUSET.SE](http://WWW.SODERSJUKHUSET.SE)

  
SÖDERSJUKHUSET  
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

## Vad är Durbis, Tambocor och Sotalol?

Dessa tre läkemedel motverkar störningar i hjärtrytmen och används för att förebygga och behandla oregelbunden hjärtrytm. Sotalol är en så kallad betablockerare som minskar stresshormonernas effekt på hjärtat och leder därför till sänkning av pulsen och blodtrycket.

## Så använder du läkemedlet?

Du bör svälja tabletten hel, gärna tillsammans med vätska. Om tabletten har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra delar av effekten. Du bör undvika läkemedel som kan påverka saltbalansen, till exempel laxermedel och urindrivande läkemedel, eller att kombinera dessa med extra kaliumsalttillskott.

Sotalol bör tas cirka en timme före måltid och inte tillsammans med vissa läkemedel mot sur mage och halsbränna eftersom det då finns risk för att effekten eller upptaget av Sotalol minskar.

Med Durbis och Tambocor spelar det ingen roll om man tar tabletten med mat eller inte. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har individuellt anpassat dosen för dig. Ofta börjar man med en låg dos som ökas till en lämplig måldos.

En del personer behöver ligga inne på sjukhuset när behandlingen med Tambocor startar.

Durbis, Tambocor och Sotalol kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Informera därför alltid din läkare om att du behandlas med något av dessa läkemedel. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera det med din läkare. Om behandlingen med Sotalol ska avslutas bör du trappa ner användningen under 1-2 veckor.

Om du har tagit mer Durbis, Tambocor eller Sotalol än du borde, ska du omedelbart kontakta din läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen.

Vissa läkemedel ska inte kombineras med Sotalol, Durbis eller Tambocor. Det gäller till exempel en del antibiotika, psykofarmaka och magmediciner. Uppllys därför alltid läkaren om att du tar Sotalol, Durbis eller Tambocor så att du inte får läkemedel som ökar risken för biverkningar.

## Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmet att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

## Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Om du får nya symptom när du börjar ta medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Många biverkningar uppträder framförallt i början av behandlingen och försvinner oftast av sig själva.

Alla tre läkemedlen kan paradoxalt nog ge rytmrubbningar:

- Durbis kan ge muntorrhet, svårt att tömma urinblåsan och mag-tarmbesvär. Eftersom Durbis kan ge muntorrhet är noggrann munhygien viktig.
- Tambocor kan ge yrsel, ostadighetskänsla och synstörningar. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående.
- Sotalol kan bland annat ge trötthet, yrsel, potensproblem och sömnstörningar.