

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus och mer än 4000 personer arbetar här.

Sachska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Varje år vårdas cirka 55 000 patienter på sjukhuset, drygt 360 000 besöker specialistmottagningarna och mer än 6 500 barn föds här.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller på www.fass.se.

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED NITRO



SÖS
SÖDERSJUKHUSET

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE

SÖS
SÖDERSJUKHUSET
VERKSAMHETSOMRÅDE KARDIOLOGI

Vad är nitroglycerin?

Nitroglycerin är ett läkemedel som vidgar blodkärlen i hjärtat och kroppen. Detta avlastar hjärtat och underlättar dess arbete, samt förbättrar syresättningen av hjärtmuskeln. Nitroglycerinpreparat finns i två former, ett långverkande preparat och ett kortverkande. Det långverkande preparatet används för att förebygga kärlkramp och det kortverkande används som en akut behandling av ett kärlkrampsanfall.

Så här använder du nitroglycerin?

Snabbverkande: Nitroglycerin tas vid behov. Antingen vid ett kärlkrampsanfall, eller strax innan en fysisk ansträngning som du tror kan provocera fram kärlkramp. Tabletten/sprayen placeras under tungan. Läkemedlet tas snabbt upp av kroppen, och har effekt inom någon minut. Vid användning av läkemedlet kan blodtrycket sjunka, vilket kan leda till yrsel och ostadighet. Därför ska du helst sitta eller ligga när du tar läkemedlet, framför allt i början av behandlingen.

Vid utebliven effekt, det vill säga om kärlkrampen håller i sig trots att du tagit nitroglycerin kan du ta ytterligare doser efter några minuter. Har inte smärtan släppt efter 3 doser eller 15-20 minuter bör du söka akutsjukvård. Ring larmnumret 112 efter ambulans.

Långverkande: Du bör svälja tabletten hel, gärna tillsammans med vätska. Om tabletten har en brytskåra kan du dela den. Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra delar av effekten. Det spelar ingen roll om du tar tabletten med mat eller inte. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt. Din läkare har anpassat dosen för dig individuellt. Avbryt inte behandlingen utan att diskutera det med din läkare.

Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du upptäcker att du har glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt samma dag. Om du glömmer att ta medicinen, ta inte dubbel dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag.

Förvaring/hållbarhet

Nitroglycerin är ett flyktigt ämne, som lätt avdunstar. Det bör förvaras torrt och mörkt i rumstemperatur. Tänk på att regelbundet kontrollera utgångsdatumet på förpackningen.

Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Om du får nya symptom när du börjar ta medicinen kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta i sådana fall din behandlande doktor för en diskussion. Den vanligaste biverkningen av nitroglycerinpreparat är huvudvärk. Huvudvärken kan vara besvärlig, men den är ofarlig och brukar försvinna helt efter en tids behandling. Läkemedlet får inte tas tillsammans med vissa potenshöjande läkemedel – rådgör med din läkare.

Vill du veta mer?

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller www.fass.se.

Snabbverkande

Nitromex
Nitroglycerin
Suscard
Spray Nitrolingual
Spray Glytrin

Långverkande

Ismo
Imdur
Isodur
Isosorbidmononitrat
Monoket