

የታካሚ መረጃ

በፊት እና በኋላ

ዲፊቡሌሽን/ የብልት ከንፈር (ላቢያ) ሕክምና



Amhariska

**SÖS**

SÖDERSJUKHUSET

## **የሴት ልጅ ብልት ግርዛት/ግርዛት ምን ማለት ነው?**

የሴት ልጅ ግርዛት በሚካሄድበት ጊዜ፣ ምንም ዓይነት ህክምናዊ ምክንያት በሌለበት፣ የብልት ውጫዊ አካል የተወሰነ ክፍል ወይም ሙሉ በሙሉ ይወገዳል/ይቀየራል።

ይህ ደግሞ ቆይቶ በሕይወት ላይ የተለያዩ አሉታዊ ተጽእኖችን ሊያስከትል ይችላል።

የሚከተሉት ችግሮች እንደተካሄደው የግርዛት ዓይነት ሊለያዩ ይችላሉ። አሁን ያለው ሁኔታ ፈርሶናዊ ግርዛት (ኢንፊቡሌሽን) ተብሎ የሚጠራ ሲሆን፣ ይህም ብልት ከንፈሮቹ/ላብያዎቹ ከ ማህጸን ቀዳዳ ፊት ለ ፊት ላይ እንዲጣበቁ ያደርጋል።

በ ቆዳው ድልድይ/የተሰፋው አካል ላይ ያሉት ጠባብ ቀዳዳዎች የተለያዩ ሊታዩ የሚችሉ ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከእነዚህም መካከል፡

- ሽንት መሸናት አስቸጋሪ ወይም ረጅም ጊዜ እንዲወስድ ሊያደርግ ይችላል
- ከ ወር አበባ ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ
- ጾታዊ ግንኙነት ማድረግ ህመም የተሞላበት፣ አስቸጋሪ ወይም ፈጽሞ የማይቻል እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል።
- እንደ ሰርቪካል ፓፕ ስሚር ምርመራ ያሉ የማህጸን ህክምና ምርመራዎችን ማድረግ አስቸጋሪ ሊሆን ወይም ፈጽሞ ላይቻል ይችላል
- በተፈጥሯዊ መንገድ ልጅን መውለድ ወይም በወሊድ ጊዜ የሚደረጉ የማህጸን ህክምና ምርመራዎች ማካሄድ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል

## **ቀዶ ሕክምና**

በተጣበቀው የብልት ከንፈር/ላቢያ ላይ ያለው ጠባብ ቀዳዳ ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች የሚያስከትል ከሆነ ዴፊቡሌሽን የሚባል ቀዳዳን የመክፈት ቀዶ ጥገና በማካሄድ ልንረዳ እንችላለን።

የቀዶ ጥገና ሃኪሙ (ዶክተሩ) በማህጸን በር ፊት ለፊት ላይ የተጣበቁትን የብልት ከንፈሮች በመክፈት ከንፈሮቹን በሁለቱም ጎን ጠርዝ ላይ ይሰፋቸዋል።

ይህም የመዳን ሂደትን በማፋጠን፣ ህመምን በመቀነስ እና በመዳኑ ሂደት የብልት ከንፈሮቹ መልሰው እንዳይጣበቁ ለማድረግ የሚጥቅሙ ናቸው።

ስፌቶቹ ቢያንስ ከ 2-3 ሳምንታት የሚቆዩ ሲሆን ከዛም በራሳቸው ጊዜ ሚምተው የሚጠፉ ናቸው። ቀዶ ጥገናው በሚካሄድበት ጊዜ ህመም እንዳይሰማሽ፣ ቀዶ ጥገናው ከመጀመሩ በፊት የቆዳ ድልድይ/እንዲጣበቅ የተደረገው አካል ላይ ማደንዘዥ ይሰጥሻል።

ቀዶ ጥገናው ነብሰ ጡር ብትሆኔም እንኳ ማካሄድ ይችላል።

**ከ ቀዶ ጥገናው በፊት፡**

ቀዶ ጥገናው ከመደረጉ በፊት ባለው ጊዜ ሕወትሽን እንደተለመደው መኖር ትችያለሽ። በተጨማሪም ወደ ክሊኒኩ ከመምጣትሽ በፊት ምግብ በልተሽ ብትመጪ ይመረጣል።

ቀዶም ብለሽ ድረሽ። ከቀዶ ጥገናው በኋላ በቀጥታ ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ።

ለቀዶ ጥገናው 1.5 ሰዓታት ሲቀሩት አስቀድሞ የተሰጠሽን የማደንዘዣ ክሬም በብልትሽ አከባቢ የቆዳ ድልድዩ ላይ/የተጣበቀው አካል ላይ በመቀባት የሚከተሉትን የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶች ውሰጅ፡

-ኑባሰ ጡር ካልሆንሽ 2 አልቪዶን (ፓራሲታሞል) 500 ሚሊ ግራም እና 1 አይቡፕሮፊን 400 ሚሊ ግራም።

-ኑባሰ ጡር ከሆንሽ 2 አልቪዶን (ፓራሲታሞል) 500 ሚሊ ግራም።

ቀዶ ጥገናው በሚካሄድበት ቀን፣ በባለፈው ጉብኝትሽ ዶክተሩን ያገኘሽበት ቦታ ማለትም ወደ Gynmottagningen (ግዴንሞታጂንጅን) [ደረጃ 0 አሳንሰር B) በመሄድ በእንግዶች መቀበያ ዴስኩ ላይ ተመዘገቢ።

**ከ ቀዶ ጥገናው በኋላ፡**

- የብልትሽን አከባቢ ሳሙና ሳትጠቀሚ ውሃ ብቻ በመጠቀም ታጠቢ
- መጀመሪያ ላይ ሽንት ሲሸና ወይም ስትታጠቢ ምቹ ሆኖ ላታገኘው ትችያለሽ
- ቁስሉ እስከሚድን ድረስ ቢያንስ ለ 4 ሳምንታት ጾታዊ ግንኙነት ከማድረግ ተቆጠቢ
- ለ3 ሳምንታት አካላዊ እንቅስቃሴ ከማድረግ ተቆጠቢ
- ቀዶ ጥገናው ከተካሄደ በኋላ የመጀመሪያው ቀን ላይ ህመም ሊሰማሽ ይችላል። እባክሽን ህመም ለመቀነስ በመደበኝነት የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶችን ውሰጅ።

2 አልቪዶን (ፓራሲታሞል) 500 ሚሊ ግራም በቀን 3 ጊዜ። ኑባሰ ጡር ወይም ወይም አለርጂ ያለብሽ ከሆነ ደግሞ አንድ 1 ኢቡፕሮፊን 400 ሚሊ ግራም በቀን 3 ጊዜ መውሰድ ትችያለሽ።

የህመም ስሜቱን የሚቀንስ የማደንዘዣ ጄልም ይሰጥሻል። ይህንን ጄል በቀን በተደጋጋሚ መጠቀም ትችያለሽ።

- ህመሙ ብየቀኑ እየቀነሰ መምጣት አለበት
- አስፈላጊ ከሆነ ከቀዶ ጥገናው በኋላ ለ አንድ ሳምንት የሕክምና እረፍት መውሰድ ትችያለሽ

የሰውነትሽ መቀት ከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ከሆነ፣ ወይም ህመሙ እየባሰ ከሄደ፣ Gynmottagningen (ጋይሞታጂንጀን) ጋር **08-123 627 00** በመጠቀም በስራ ሰዓት መደወል ትችያለሽ፣ ወይም ከሥራ ሰዓታት ውጪ (ምሽት፣ ሌሊት ወይ የሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ላይ) ከሆነ Gynakuten(ጋይናኩተን) ን ማናገር ትችያለሽ።  
ከ ቀዶ ጥገናው በፊት ጥያቄዎች ቢኖሩሽ ከGynmottagningen ጋር መነጋገር ትችያለሽ።



**SÖDERSJUKHUSET**

GYMOTTAGNINGEN, 08-123 627 00  
SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-123 610 00  
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA  
[WWW.SODERSJUKHUSET.SE](http://WWW.SODERSJUKHUSET.SE)