Mall för beskrivning/bedömning av vulva vid olika typer av könsstympning

AMEL
Mottagning för omskurna kvinnor

SÖS
SÖDERSJUKHUSET

Vulvaanatomi



Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 1

Resektion av klitoris, helt eller delvis, samt klitoriskappan

Yttre och inre blygdläppar inspekteras intakta.
Symmetriska/asymmetriska.

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris, alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig.

Typ 2

Resektion av klitoris, helt eller delvis, samt klitoriskappan + resektion av inre blygdläppar

Yttre blygdläppar inspekteras intakta. Inre blygdläppar ser ut att vara resecerade bilateralt/unilateralt (på höger/vänster) sida.

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig.

Många kvinnor är födda med asymmetriska blygdläppar. Beskriver patienten själv att asymmetrin är på grund av könsstympningen?
Ser du ärrvävnad som inger misstanke om att området skurits i?
Om inte, så döms det i första hand som normalvariation. Det är ovanligt med resektion av endast en blygdläpp.

Typ 3

Infibulation – försnävning av vaginalöppningen genom att inre eller yttre blygdläppar sytts ihop (med eller utan borttagande av klitoristoppen)

En hudbrygga (bestående av blygdläppar) sträcker sig från klitorisområdet ner mot slidöppningen. Hudbryggan täcker/täcker ej urinröret vid inspektion.

Slidöppningen är försnävad och genomsläpper ett/två fingrar/en bomullstops.

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig.

Vid ofullständig läkning i hudbryggan kan en t ex lägga till:

I mitten av hudbryggan ses två mm-stora öppningar (patienten kan ibland beskriva att urin och mensblod rinner ut från öppningarna).

Beskriv gärna om urinrörsmynningen (uretra) syns eller om hudbryggan måste lyftas upp för att se den. Går den ens att se? Detta är viktigt vid förlossning. Vagina ska inte bara kunna genomsläppa två fingrar, det ska även vara öppet upp över urinröret också, precis som hos kvinnor som inte är omskurna.

Typ 4

Andra skadliga ingrepp mot vulva utan medicinsk grund

T.ex prickning, snittning eller skrapning. Dessa skador brukar vanligtvis inte ge synliga ärr, men kan orsaka psykologiskt trauma.

Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta AMEL-mottagningen.
Telefonnummer: 08- 616 27 00
www.sodersjukhuset.se/amelmottagningen
På vår hemsida finns patientinformation översatt till olika språk.

Adress: Södersjukhuset. Gynekologiska mottagningen.
T-bana: Skanstull. Buss 3 mot Södersjukhuset.

Telefontider:
Måndag-torsdag kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag kl. 08.00- 12.00

Vårdguidens e-tjänster.
Du kan också kontakta oss via webben
Logga in på www.1177.se.
Genom 1177 Vårdguidens tjänster erbjuds du rådgivning dygnet runt.

Telefonnummer: 1177
Rådgivning 1177 på somaliska: 0771 1177 91
Rådgivning 1177 på arabiska: 0771 1177 90

Fotogruppen Aprill 2019

SÖS
SÖDERSJUKHUSET

Kvinnokliniken Södersjukhuset avd 72 | 08-616 12 72 |
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE